

# **Vejledning til forældre om tandskade på mælketænder**

## Ved undersøgelse på klinikken er konstateret følgende skader:

### Tanden er løs

Tanden vil i de fleste tilfælde vokse fast igen i løbet af nogle uger. I denne periode er det vigtigt at sørge for en god mundhygiejne, at give barnet skånekost og at begrænse brugen af sut mest muligt.

### Tanden er slået skæv eller skubbet ind i kæben

Mælketænder, som er skubbet ind i kæben, vil ofte af sig selv vokse frem igen i løbet af 3-8 uger.

Forholdsregler som ovenfor.

I enkelte tilfælde kan der udvikle sig en akut betændelse i knoglen omkring sådanne tænder.

Betændelsen viser sig ved kraftig hævelse og rødme samt smerter og ofte feber.

Det er vigtigt, at sådan en betændelse behandles hurtigt, så den ikke påvirker de blivende tænders tandkim.

### Tanden er slået helt ud

Sørg for god mundhygiejne, mens såret heler.

### Brud på tandkronen

Sørg for god mundhygiejne. Søg tandlæge, hvis der kommer smerter eller hævelse på tandkødet (tandbyld) inden næste kontrolundersøgelse.

### Sår på tandkød eller læber

Sår på tandkød og læber heler normalt hurtigt, hvis man sørger for en god mundhygiejne. Er skaden sket udendørs, kan såret være forurennet.

Undersøg om barnets stivkrampevaccination dækker.

## Skånekost

Ved skånekost forstås blød kost uden hårde fødeemner, men ikke nødvendigvis flydende kost.

## Mundhygiejne

Omhyggelig renholdelse af tænder og tandkød er en forudsætning for hurtig heling. Hvis tandbørstning er vanskelig eller umulig, kan den suppleres eller erstattes med afvaskning af tænder og tandkød med 0,12% klorhexidin på en vatpind. (Klorhexidinopløsning fås på apoteket) Se vejl. på flasken.

## Forsikring

Hvis forældrene har en familieforsikring, der dækker tandskader, vil det være denne, der skal betale den endelige behandling i 20-22-års alderen. Rekvirer derfor en blanket til skadeanmeldelse hos forsikringsselskabet.

Forældrene bør anmelde skaden til deres forsikringsselskab.

## Kontrol undersøgelse

Efter alle tandskader vil man med passende mellemrum undersøge og eventuelt røntgenfotografere tænderne for at opdage sene følgeskader som rodbetændelse og knoglebetændelse. De blivende tænders anlæg, tandkimen, ligger tæt på mælketændernes rødder og dannes allerede omkring fødsel. Skader på mælketænder og sene følgeskader, som ikke opdages og behandles, kan give skader på de blivende tænder. Det er derfor vigtigt at følge kontrolundersøgelserne.

Venlig hilsen  
Tandlæge

**Tandplejens tlf. 7259 7840**

**Tandklinikker:**

Boesagerskolen i Smørum, Flodvej 89  
[Smoerumtand@egekom.dk](mailto:Smoerumtand@egekom.dk)

Bækkegårds-klinikken i Ølstykke, Bækkegårds Plads 1  
[Oelstykke tand@egekom.dk](mailto:Oelstykke tand@egekom.dk)

Tandplejens Administration, Bækkegårds Plads 1  
[Tandadm@egekom.dk](mailto:Tandadm@egekom.dk)

Egedal Kommunes Tandpleje, [www.tandplejen-egedal.dk](http://www.tandplejen-egedal.dk)

CFT, Center for Tandregulering, Baltorpvej 20 B, 2750 Ballerup  
[info@cftand.dk](mailto:info@cftand.dk)

Tandlægevagten i Hillerød, tlf. 70 25 00 41



Egedal Kommunes  
Tandpleje